

藥物成分

劑型 櫃號

Olmesartan medoxomil

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-689

☞ 藥品商品名及含量

雅脈膜衣錠 40 毫克/錠 (Olmotec)

妥得降膜衣錠 40 毫克/錠 (Olmesardin)

☞ 藥品作用

血管收縮素 II 受體拮抗劑(ARBs)，用來治療高血壓。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。可與食物一起或空腹時服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不全病患($GFR < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$)及曾經對本藥主成份 olmesartan 或其他成份過敏。
2. 若您已在服用鋰鹽、血管張力素轉化酶抑制劑、保鉀利尿劑、鉀補充劑、非類固醇類消炎止痛藥，請告訴您的醫師或藥師，特別是**糖尿病或腎功能不全患者**，且正在服用含 Aliskiren 成分藥品。
3. 常見副作用為可能有**頭痛、暈眩、低血壓、腹瀉、消化不良、疲倦**等現象，一般都不嚴重且不一定會發生，若症狀嚴重或持續時請回診。
4. 如有下列症狀，請立刻就醫：**頭暈昏厥、過敏反應(搔癢、蕁麻疹、喉頭腫脹、呼吸困難、胸悶)、水腫、排尿量改變、血尿、體重快速增加或減少、腹瀉嚴重**。
5. 懷孕等級 D，**女性計畫懷孕或懷孕婦女不建議服用**。當發覺懷孕時，應立即停止使用直接作用於腎素-血管加壓素系統的藥物，其會傷害發育中的胎兒甚至造成死亡。本藥分泌到母乳的量不明，需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。