



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Amantadine Sulfate</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202310／檔號：2023-019		

## ☞ 藥品商品名及含量

多巴定膜衣錠 100 毫克/錠 (Dopadine F.C.)

安滿達膜衣錠 100 毫克/錠 (Amanda F.C.)

## ☞ 藥品作用

治療巴金森病身體顫抖、運動功能退步等症狀以及預防及治療 A 型流行性感冒的症狀。

## ☞ 服用方式

1. 常用劑量每日 2 次，一次 1 粒
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾患癲癇發作、腎功能不良、充血性心衰竭或周邊水腫者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是鉀離子補充劑。
3. 本藥可能會引起中樞神經系統反應或視線模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數，不可驟然停藥避免急速顯著惡化。
5. 常見副作用為噁心、直立式低血壓、暈眩、尿滯留、失眠、焦慮、皮膚炎等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：痙攣、血小板減少、嗜中性白血球減少(發燒、發冷、出汗、類感冒症狀)。

臺北市立

7. 懷孕期間使用有風險對胎兒造成傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。