

藥物成分

劑型

櫃號

Tadalafil

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-761

☞ 藥品商品名及含量

犀利士膜衣錠 5 毫克/錠 (Cialis F.C.)

樂軒昂膜衣錠 5 毫克/錠 (Lonfilis F.C.)

☞ 藥品作用

本藥可增加海綿體血流量、放鬆攝護腺和膀胱平滑肌。用於治療勃起功能障礙、良性攝護腺肥大症所伴隨的泌尿道症狀。

☞ 服用方式

1. 治療勃起功能障礙(固定低劑量)及良性攝護腺肥大，通常每日 1 次，每次 1 粒。

請依醫囑服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若快到下次服藥時間，在下次時間服藥即可，不可為補吃而服用雙倍劑量。

2. 治療勃起功能障礙(需要時使用，此用法請先諮詢醫/藥師)，通常於性行為前至少 30 分鐘口服 1-4 粒，每 24 小時只能服用一次。若一周需使用 2 次以上建議改固定低劑量使用。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重肝/腎功能不全、心血管疾病(高/低血壓、心絞痛、心臟衰竭、心律不整、最近曾中風或心肌梗塞)、非動脈性前部缺血性視神經病變(NAION)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是硝酸鹽類藥物(如：硝酸甘油、isosorbide mononitrate、isosorbide dinitrate)、nicorandil，避免產生嚴重低血壓。某些藥物可能有交互作用，如 alpha 阻斷劑(攝護腺肥大藥)、抗愛滋藥的蛋白質酵素抑制劑、ketoconazole 或 itraconazole(抗黴菌藥)。
3. 勿過度飲酒易造成低血壓副作用；避免食用大量葡萄柚汁。
4. 常見副作用為頭痛、臉頸潮紅、肌肉疼痛、消化不良、鼻塞或流鼻水，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立聯合醫院

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心悸或心跳過快、胸痛、嚴重暈眩、聽力及視覺異常、勃起時間過長(超過4小時)或勃起異常疼痛、嚴重過敏反應(頭臉腫脹、大範圍紅疹)。

6. 懷孕：目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。哺乳：本藥可能會分泌到母乳裡，需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。本藥常規不適用於女性。