



藥物成分	劑型	櫃號
Molnupiravir 200 mg/Cap	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-809		

☞ 藥品商品名及含量

Molnupiravir 200 毫克/膠囊 (莫納皮拉韋 200 毫克/膠囊)

☞ 藥品作用

具有重症風險因子，未使用氧氣且於發病5天內之 ≥ 18 歲之輕度至中度COVID-19確診病人，且無法使用其他建議藥物者。

☞ 服用方式

- 劑型為膠囊，每 12 小時服用每次服用 4 顆(如上午 8 點和晚上 8 點)，每日 2 次，共服用 5 天。
- 可與食物併服或不併服。未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
- 利用鼻胃管/口胃管投予 molnupiravir 的藥物配置方法：
 - (1)打開四顆膠囊並將內容物置於調製杯器或注射器中。
 - (2)加入 40 毫升的水。
 - (3)將膠囊內容物與水均勻混合/攪拌 3 分鐘配置完畢請盡快投予病人服用。
 - (4)建議應在懸液劑配置完成後，最晚 1 小時內盡快給予病人。
 - (5)若非配置完畢立即投予，給予前須重新均勻混和口服懸液劑 1 分鐘。
 - (6)可額外再給予水分確保所有藥物吞嚥完成，水量上限為 240 毫升。

☞ 注意事項

- 若忘記服藥在平常服用的 10 小時內服一劑，請盡快服用。如果超過 10 小時才想起請略過，從下個劑量繼續按時使用，不可服用雙倍劑量。
- 可能的藥物副作用：腹瀉、噁心、暈眩等，也可能會發生

嚴重和非預期的副作用。

3. 為確保療效，若症狀輕微請勿停藥。
4. 目前並無基於腎功能或肝功能不全或老年病人而進行劑量調整之建議。
5. 建議與具生育能力之伴侶有活躍性行為的病人，在治療期間和使用最後一劑 molnupiravir 後至少 3 個月內應正確並持續採取可靠的避孕措施。
6. 在完成完整 5 天的治療之前，即使您感到病情好轉，也請您不要停止服用 molnupiravir。
7. 在使用 molnupiravir 治療期間和使用最後一劑 molnupiravir 後 4 天內不建議餵哺母乳

其他注意事項

1. 現有的 molnupiravir 臨床資料相當有限。可能會發生先前使用 molnupiravir 時未曾通報的嚴重與非預期的不良事件。如果有任何困擾您或持續未緩解的副作用，請告知醫師或諮詢藥師。
2. 本藥尚未取得我國藥物上市許可，係因應緊急公共衛生需要，專案核予 EUA 以提供病人使用，故因使用此藥物後發生不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病時，不適用藥害救濟。