



藥物成分

劑型

櫃號

Fenoterol

口服液

版本：TPE202309／檔號：2023-595

☞ 藥品商品名及含量

適喘寧液 0.5 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Strolin liquid)

☞ 藥品作用

支氣管擴張劑，可使支氣管放鬆，呼吸道暢通，可治療或預防支氣管痙攣(支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、肺氣腫和伴有支氣管痙攣之肺支氣管障礙)。

本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 臨床上常依體重作衡量，請依醫師或藥袋指示給藥。
2. 成人(14 歲以上)：通常每日 3 次，每次 5-10 毫升。6-14 歲孩童：通常每日 3 次，每次 5 毫升。1-6 歲孩童：通常每日 3 次，每次 2.5-5 毫升。1 歲以下幼兒：通常每日 2 次，每次 2.5 毫升。
3. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
4. 若使用小量杯測量藥液，請確保測量時眼睛與刻度平視。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重甲狀腺亢進、主動脈瓣狹窄、心臟節律異常、糖尿病、氣喘。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥 digoxin、類固醇、降血鉀的藥品。

臺北市立

3. 常見副作用為心跳過快、低血鉀、低血壓，偶有眩暈疲勞、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

4. 本藥對子宮收縮具有抑制作用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

5. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。