



藥物成分

劑型

櫃號

Sumatriptan

口服藥

版本：TPE202309／流水號：2023-408

## ☞ 藥品商品名及含量

英明格速溶錠 50 毫克 (Imigran FDT)

## ☞ 藥品作用

Sumatriptan 用於偏頭痛發作之急性緩解。本藥限用於有明確診斷之偏頭痛。

## ☞ 服用方式

1. 偏頭痛發作(或有預兆發生)時服用，應及早使用，延誤使用可能導致治療效果不佳。每日最多服用兩次。
2. 使用劑量因人而異，請務必與醫師討論後，經詳細衛教後正確使用。

## ☞ 注意事項

1. 若對 Sumatriptan 有過敏反應，請告訴醫師，並禁止服用。
2. 曾患有心肌梗塞、缺血性心臟病、冠狀血管痙攣、周邊血管疾病與高血壓控制不良之患者禁止使用。
3. 偏頭痛問題未緩解時，請不要開車或使用危險機械。
4. 服用本藥可能會導致嗜睡，開車或操作危險性器械時請小心。酒精會增加本藥的嗜睡作用，請勿飲酒。
5. 服用麥角胺類藥品(ergotamine) 24 小時內不可併用本藥。反之，服用本藥後 6 小時內，不可使用麥角胺類藥品。
6. 本藥用於高血壓患者需小心，因為可能有血壓及周邊血管阻力短暫上升的現象。
7. 常見副作用為短暫的胸悶或胸痛，若症狀相當強烈並向上影響至喉部，請立即回診評估。
8. 如發生以下症狀，請立即就醫：嚴重過敏；胸悶胸痛且延伸到手臂、背部、頸部、下巴；呼吸困難；心律不整；癲癇發作；嚴重胃痛、噁心嘔吐；視力喪失改變；頭痛更嚴重。
9. 孕婦及授乳婦女不建議使用。