

藥物成分

劑型

櫃號

Lidocaine

外用
藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-653

☞ 藥品商品名及含量

人人利度凝膠 2% 30gm/支 (Lido Jelly)

力多凝膠 2% 30gm/支 (Lido Jelly)

☞ 藥品作用

皮膚局部麻醉。

☞ 使用方式

1. 通常於外科處理時，供醫瘡人員操作。
2. 勿長期使用，勿用於眼部。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對醯胺類局部麻醉劑過敏者、蠱豆症、癲癇、紫質症、高鐵血紅蛋白血症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 sulfasalazine、調節心律藥、癲癇藥、抑鬱藥、硝酸鹽或亞硝酸鹽類藥物、過敏藥、其他麻醉止痛藥等。
3. 有嚴重黏膜外傷或敗血症狀之部位，塗敷本品應予小心。
4. 常見副作用為皮膚局部反應，如：皮膚蒼白、發紅、溫度變化敏感，水腫，發癢、皮疹現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應、胸悶、呼吸困難、視力模糊、心跳異常、癲癇等。
6. 目前對孕婦使用的安全性猶未確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。