

藥物成分

劑型

櫃號

**Amlodipine/
Valsartan/
Hydrochlorothiazide**

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-027

☞ 藥品商品名及含量

力安穩膜衣錠 5/160/12.5 毫克/錠 (Exforge HCT Film Coated Tablets)

☞ 藥品作用

本藥可降低周邊血管阻力及減少水分滯留、進而穩定血壓。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每日 1 次。建議白天服用，可以搭配食物或不搭配食物一起服用。
2. 避免放置於潮濕環境，建議服用前再從包裝中取出藥錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是懷孕、心血管疾病、全身性紅斑性狼瘡、無尿症、肝腎功能不全、磺胺類衍生藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其它降血壓藥物(尤其是 ACEIs、ARBs 或 aliskiren)、digoxin、鋰(Lithium)、非類固醇抗發炎藥物(NSAID，包括選擇性 COX-2 抑制劑)、clopidogrel。
3. 糖尿病人或腎功能不全(GFR < 60 ml/min/1.73 m²)病人請勿同時併用本藥及直接腎素抑制劑(aliskiren)。
4. Hydrochlorothiazide 可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。

臺北市立

5. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 常見副作用為週邊水腫、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、背痛、咽喉炎，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：急遽的視力下降或眼部不適、持續低血壓、心悸、胸痛、呼吸困難、嚴重過敏反應。
8. 資料顯示懷孕期間使用本藥，可能對發育中的胎兒造成傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。