



藥物成分	劑型	櫃號
Nicergoline	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-682		

☞ 藥品商品名及含量

暢循脈錠 10 毫克/錠 (Nigoline Tablets)

脈立旺錠 10 毫克/錠 (Marion Tablets)

適脈旺糖衣錠 5 毫克/錠 (Sermion Tablets)

脈立旺錠 5 毫克/錠 (Marion Tablets)

☞ 藥品作用

1. 本品為半合成之麥角鹼，屬於抗交感神經類藥物，能造成周邊血管舒張，改善末梢血管循環障礙。
2. 具有抗血小板凝集作用。

☞ 服用方式

1. 本藥劑量、給藥期間，取決於臨床病況嚴重程度。通常，每日服用三次，每次 5-10 毫克。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 使用禁忌：最近有心肌梗塞、急性出血、嚴重的心搏過緩。
3. 本藥可能會降低血壓，血壓控制不穩定或有在服用其它類降血壓藥物(如擬交感神經阻斷劑)，請告知醫師。
4. 與抗血小板和抗凝血藥物(如阿斯匹靈)一同服用，可能會增加出血風險，請與醫師或藥師討論過後再服用。
5. 常見副作用為噁心、腸胃不適、頭痛、頭暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 目前未有針對孕婦使用相關資料，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 目前還不知道本藥是否會分泌至母乳裡，因此不建議哺乳期間使用 Nicergoline。