



藥物成分	劑型	櫃號
Lamivudine/ Zidovudine	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-261		

☞ 藥品商品名及含量

卡貝滋錠 150 及 300 毫克/錠 (Combivir Tablets)

☞ 藥品作用

可單獨或與其他抗病毒劑併用，以治療人類免疫缺乏病毒病毒感染。

☞ 服用方式

1. 成人的建議劑量是每天 2 次，每次 1 粒。
2. 可在飯前或飯後服藥，建議整粒吞服。若病人無法吞服藥錠，則可在壓碎藥錠後加入少量半固態食物或液體，並立即服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胰臟炎病史。使用本藥導致胰臟炎的機率不高，但使用此藥時如有出現腹痛、噁心、嘔吐等情形仍需盡快就醫。
2. 請告訴醫師或藥師您正在使用的藥物，特別是 phenytoin, clarithromycin, emtricitabine, stavudine。
3. 常見副作用為皮疹、腹部疼痛、腹瀉、食慾下降、噁心嘔吐、肌肉骨骼疼痛、頭痛、頭暈、睡眠障礙、咳嗽，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 懷孕等級 C，資料顯示對懷孕時使用的安全性尚未被確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 為降低嬰兒感染人類免疫缺乏病毒的風險，服藥期間不建議哺乳。