



藥物成分	劑型	櫃號
Rotavirus Vaccine	口服液	
版本：TPE202309／櫃號：2023-384		

☞ 藥品商品名及含量

輪達停口服活性五價輪狀病毒疫苗 2 毫升/劑 (RotaTeq)

☞ 藥品作用

用於預防輪狀病毒所引起的腸胃炎。

☞ 服用方式

1. 僅供口服使用。

2. 完整的疫苗接種時程共須接種三劑：第一劑應於六至十二週齡時接種，再以四-十週間隔時間接種後續第二劑及第三劑，第三劑不得晚於三十二週齡。

3. 撕開包裝袋，取出投藥軟管，垂直拿住軟管，輕彈帽蓋，藉此清空管尖中的液體，依順時鐘方向轉緊帽蓋以戳破軟管尖端，再依逆時鐘方向轉下帽蓋，向著嬰兒的臉頰內側，將液劑緩緩擠入嬰兒口中。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腸套疊病史、未經矯正的胃腸道畸形、疑似免疫功能缺陷、急性嚴重發燒性的疾病、腹瀉嘔吐。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。

3. 在接種疫苗之前或之後，嬰兒飲食無任何限制。

4. 和下列疫苗可同時接種：六合一疫苗、白喉-破傷風-全細胞百日咳疫苗、白喉-破傷風-非細胞性百日咳疫苗、b 型嗜血桿菌疫苗、不活化小兒麻痺疫苗、B 型肝炎疫苗、肺炎鏈球菌結合型疫苗及 C 型腦膜炎球菌結合型疫苗。

5. 小兒麻痺口服疫苗與本項輪狀病毒疫苗應間隔兩週。

6. 常見副作用為腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：腸套疊(腹痛、嘔吐、血便)。