



藥物成分

劑型

櫃號

Metronidazole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-295

## ☞ 藥品商品名及含量

德利治癒膠囊 250 公絲 (Tolizole Capsule)

## ☞ 藥品作用


治療某些細菌所引起的骨骼及關節感染、腦膜炎、心內膜炎、腹腔內感染、子宮內膜炎、肺炎等，此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

## ☞ 服用方式

1. 此藥若能在體內達到固定的濃度則可達到最好的藥效，因此可將一天 24 小時分隔為相等的時段來給藥，譬如一天服藥 3 次，則每 8 個小時給藥一次；假如一天服藥 4 次，則每 6 個小時給藥一次。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中樞神經系統方面的疾病、肝臟、血液方面的疾病、克隆氏病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑，如:Warfarin 和一些維他命。
3. 服用此藥後，可能會產生輕微頭暈及目眩，尤其在剛開始服藥期間。因此，在尚未完全適應此藥之前，當開車或操作危險機械時，必須小心謹慎。
4. 服用此藥時，必須依照醫師的指示，用完所有處方的藥物 (通常是 7 至 14 天)，即使覺得感染的症狀已經完全消除，仍須服完所有處方的份量，以免感染復發，或將來細菌產生抗藥性。

- 
5. 常見副作用為口乾、味覺改變、拉肚子、胃口降低、噁心、金屬味、腹部抽痛、嘔吐、頭痛、頭暈目眩，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
  6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：急性過敏反應(呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂)、嚴重皮膚不良反應(口腔/黏膜潰爛、表皮脫落、眼睛癢、水泡)。
  7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
  8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。