

藥物成分

劑型

櫃號

Amlodipine /  
Benazepril HCl

口服藥

版本：TPE202310 / 檔號：2023-023

## ☞ 藥品商品名及含量

諾壓錠 5 毫克/10 毫克/錠劑 (Amtrel Tablets)

可得寧膜衣錠 5/10 毫克/錠劑 (Co-Amndiline F.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療高血壓。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 0.5~1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不全、血管性水腫病史，以及對 amlodipine/benazepril 過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是心血管用藥、保鉀利尿劑、鉀補充劑。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為咳嗽、水腫、低血壓、高血鉀症。但一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管性水腫包含嘴唇、臉部、四肢、舌頭、聲門和喉部。
6. 禁用於懷孕女性，因為在懷孕女性中的安全性尚未確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。