



藥物成分	劑型	櫃號
Vilanterol/ Umeclidinium	乾粉 吸入劑	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-793		

- ☞ 藥品商品名及含量
安肺樂易利達粉狀吸入劑 55 及 22 微克/每定量 (Anoro Ellipta)
- ☞ 藥品作用
用於慢性阻塞性肺病之維持治療。
- ☞ 使用方式
每日一次，每次 1 劑。

勿遮蔽氣孔

<p>1. 滑開紅色外蓋至聽到「卡搭」聲，即完成一次劑量之填充</p>	<p>2. 先向旁邊盡量吐氣</p>	<p>3. 嘴巴含住吸口，以長而穩定的方式深吸一口氣 (深吸目的是要讓藥粉進入肺部深處，達到良好的治療效果)</p>
<p>4. 移開吸入器，閉住氣至少 3-4 秒鐘</p>	<p>5. 慢慢吐氣</p>	<p>6. 將紅色外蓋向上滑回原位即可</p>

1. 請於需用藥時再打開蓋子。
2. 每 24 小時不可使用超過一次。請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補服而用雙倍劑量。
3. 不適用於緩解急性支氣管痙攣或治療氣喘。
4. 禁用於有嚴重乳蛋白過敏問題的患者，或已證實對成分或任何賦形劑過敏的患者。
5. 吸藥前要先慢慢吐氣，但請注意不要對吸嘴吹氣。
6. 如果有下列症狀，請立即就醫：過敏反應、支氣管痙攣、急性青光眼徵兆(視覺模糊、嚴重眼睛痛)、尿滯留惡化。
7. 如果您有以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：咳嗽帶痰、口乾、消化不良、腹痛等。
8. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

清潔方式

請用乾面紙或布清潔吸口，不能用水清洗或放入水中。

儲存方式

室溫儲存，自藥盒取出後可存放六周。

如何觀測剩餘藥量

1. 吸入劑瓶身有一個剩餘劑量的視窗，共含有 30 劑。
2. 當您的吸入器只剩下小於 10 劑時，計數器左邊會呈現紅色提醒您需要準備新的吸入器

