



藥物成分

劑型

櫃號

Simvastatin

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-746

## ☞ 藥品商品名及含量

欣暢血膜衣錠 20 毫克/錠 (So. H. Film-coated Tablets)

喜克脂膜衣錠 20 毫克/錠 (Simvahexal Film-coated Tablets)

## ☞ 藥品作用

本藥可減慢體內膽固醇的生成，主要用來治療高膽固醇血症及高三酸甘油酯血症，減少發生心血管疾病或中風的機會。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 0.5~1 粒，晚飯後或睡前服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝臟或腎臟**方面的疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物(包含健康食品)，特別是抗凝血劑 warfarin、cyclosporine、erythromycin、diltiazem、amlodipine、verapamil、dronedarone、HIV 藥物、抗黴菌藥 itraconazole、或其他降血脂藥。
3. 請勿飲酒及大量葡萄柚汁，可能會加重此藥之副作用。
4. 本藥可能會影響血糖控制，使用期間請注意血糖的變化。
5. 副作用相當少見，但有可能發生：**頭痛、消化不良、噁心、腹痛**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**若出現眼睛/皮膚變黃、茶色尿液(黃疸)、右上腹疼痛、不明原因的肌肉疼痛、肌肉無力或痙攣，尤其伴有全身不適、虛弱或發燒的現象。**
7. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請先告知醫師；服藥期間不可哺餵母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。