



藥物成分

劑型

櫃號

Agomelatine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-514

☞ 藥品商品名及含量

煩多閃膜衣錠 25 毫克/錠 (Valdoxan)

☞ 藥品作用

治療成人重鬱症及廣泛性焦慮症。

☞ 服用方式

1. 通常每日睡前服用 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 CYP1A2 強抑制劑(如 fluvoxamine、ciprofloxacin)。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
4. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. **本藥在開始服藥期間或劑量改變時，應特別注意情緒的變化，若有出現類似憂鬱情緒惡化、自殺意念、激動焦躁、恐慌或不尋常的行為，請立即回診或告知醫師。**
6. 常見副作用為頭痛、頭暈、困倦、失眠、腹痛、便秘、噁心、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如有下列症狀，應立即停止使用 Valdoxan：肝損傷的症狀(如深色尿、淺色糞便、黃皮膚/眼睛、右上腹痛、持續發生且無法解釋的疲累)。
8. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

臺北市立

本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HO

TAIPEI CITY

HO

TAIPEI CITY

HO

TAIPEI CITY

HO