



藥物成分	劑型	櫃號
L-iso-leucine / L-leucine / L-valine	口服液	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-279		

## ☞ 藥品商品名及含量

胺舒靈懸浮液, 20 克/包 (Licure Suspension)

## ☞ 藥品作用

支鏈胺基酸之營養補給。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 包。
2. 每包含有三種支鏈胺基酸，包含 0.952 克異白胺酸(L-iso-leucine)、1.904 克白胺酸(L-leucine)與 1.144 克頡胺酸(L-valine)。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是先天性代謝缺陷、支鏈胺基酸代謝異常，例如楓糖尿症、異戊酸血症等。
2. 常見副作用為便秘、腹瀉、腹脹不適、嘔吐、食慾減退、胃灼熱、口渴、打嗝，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：【過敏反應(皮疹、搔癢、發紅等)】、代謝功能異常(如血氨增加)、肝腎功能異常。
4. 女性計畫懷孕、已懷孕或哺乳請告知您的醫師。
5. 本品僅含支鏈胺基酸，無法補充所有必需胺基酸，建議仍須配合日常飲食或合併其他營養補給藥品使用。