



藥物成分	劑型	櫃號
Moxifloxacin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-673		

☞ 藥品商品名及含量

摩斯羅膜衣錠 400 毫克/錠 (Mosflow F.C.)

威洛速膜衣錠 400 毫克/錠 (Avelox F.C.)

☞ 藥品作用

本藥為抗生素，用於治療成人(18歲以上)細菌引起的感染症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。藥品應與水整粒吞服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因使用 quinolone 或 fluoroquinolone 類藥品引起過敏以及重症肌無力、癲癇、心律不整或低血鉀的人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血糖藥、抗凝血藥、抗心律不整藥、抗憂鬱藥及類固醇。
3. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
4. 若有服用制酸劑、sucralfate、抗反轉錄病毒藥物(如：didanosine)、綜合維他命或其他含鎂、鋁、鐵或鋅的製劑，需在服用此藥前 4 小時或後 2 小時給予。
5. 常見副作用為頭痛、暈眩、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、精神不穩、心跳異常、嚴重肌肉(腱)疼痛腫脹、血糖異常、視覺障礙、耳鳴或聽力損傷等症狀。

臺北市立

7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到乳汁，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。