

藥物成分

劑型

櫃號

Lenvatinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-645

☞ 藥品商品名及含量

樂衛瑪膠囊 4 毫克/膠囊、10 毫克/膠囊 (Lenvima)

☞ 藥品作用

治療分化型甲狀腺癌、腎細胞癌、肝細胞癌、子宮內膜癌。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，可隨餐或空腹使用，需於每日同一時間服用。
2. 可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體(水或蘋果汁)至少 10 分鐘，再攪拌至少 3 分鐘後服用，喝完再額外倒入一大湯匙的液體飲用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，且未能在 12 小時內服用，應略過該次劑量並且於原定服藥時間投予下一次劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不全、高血壓、心臟疾病及腸胃道疾患。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有服用其他藥物，特別是抗心律不整藥物、骨質疏鬆藥物(雙磷酸鹽及 denosumab)。
3. 服用後可能導致傷口癒合功能受損，若有預定手術應告知醫師。
4. 常見副作用為高血壓、腹痛、腹瀉、疲倦、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：胸痛、心肌梗塞、中風或嚴重腹痛。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，懷孕婦女使用此藥可能對胎兒造成傷害。有生育能力的婦女在使用此藥期間及服用最後一個劑量後 30 天內應採取有效的避孕措施。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間及服用最後一個劑量後 7 天內不應哺乳。