



藥物成分	劑型	櫃號
Benzydamine	噴劑	
版本：TPE202309／檔號：2023-535		

☞ 藥品商品名及含量

得伏寧加強消炎噴液劑 3 毫克/毫升 (Difflam Forte Anti-inflammatory Throat Spray)

克炎寧加強消炎噴液劑 3.0 毫克/毫升 (Coserrin Forte Anti-Inflammatory Throat Spray)

☞ 藥品作用

舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

☞ 使用方式

1. 成人或大於12歲：疼痛紅腫部位直接噴液2~4次後緩慢吞服。如有必要每隔1.5~3小時可重複使用。年齡6~12歲：疼痛紅腫部位直接噴液2次後緩慢吞服。如有必要每隔1.5~3小時可重複使用。6歲以下孩童：不建議使用。
2. 除非在醫師指示之下，不宜超過連續治療7天以上。
3. 清潔說明：使用後，用乾淨的面紙擦乾噴嘴以避免阻塞。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，如對 benzydamine 或其他所列成份過敏者。
2. 常見不良反應通報是口腔麻木感，其他的局部不良反應(較不常見)，包括乾燥、口渴、刺痛、口腔發熱以及味覺改變。
3. 懷孕等級 B，須經醫師評估後才能用於懷孕期間；亦須經評估才能用於哺乳期間。