



藥物成分	劑型	櫃號
Levetiracetam	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-648		

☞ 藥品商品名及含量

優閒膜衣錠 500 毫克/錠 (Keppra)

意必寧膜衣錠 500 毫克/錠 (Nobelin)

希樂平膜衣錠 1000 毫克/錠 (Pharacetam)

☞ 藥品作用

十六歲以上病人之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。四歲以上孩童或成人病人之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病人之肌抽躍性癲癇發作，以及十二歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。

☞ 服用方式

1. 每日 2 次，每次劑量依醫師處方指示。飯前或飯後均可。
2. 非經醫師指示請勿擅自停藥，突然停藥可能會引起癲癇發作，或增加發作頻率。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病：對本藥主成份 levetiracetam 或對其他 pyrrolidone 衍生物敏感；腎、肝功能不良者。
2. 本藥可能引起嗜睡、暈眩及無力感，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械及從事具潛在危險之活動。
3. 常見副作用為無力感、嗜睡、睏倦、頭痛、疲勞、咳嗽，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：抑鬱徵狀及(或)有自殺念頭時。

5. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

6. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。