



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Dapagliflozin +Metformin</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-137		

## ☞ 藥品商品名及含量

**釋多糖持續性藥效膜衣錠 10 毫克/1000 毫克 (Xigduo XR Extended-Release Tablets)**

## ☞ 藥品作用

XIGDUO XR (dapagliflozin 和緩釋型 metformin HCl) 適用於配合飲食和運動，以改善以下第二型糖尿病成人患者的血糖控制：已在接受Dapagliflozin和Metformin合併治療者，或使用Metformin但控制不佳者。

## ☞ 服用方式

1. 醫師應根據患者目前的治療個別訂定 XIGDUO XR 的起始劑量，劑量可根據有效性和耐受性調整，但不可超過 Dapagliflozin 10 mg 和 Metformin HCl 2000 mg 的每日最大建議劑量。
2. XIGDUO XR 應該每天服用一次，於早晨與食物併服，採漸進方式調高劑量，以減少 Metformin 引起的胃腸副作用。
3. XIGDUO XR 錠必須整粒吞服，切勿磨碎、切割或嚼碎。錠中無活性的成分有時會以柔軟的含水塊狀物從糞便中排出，形狀類似原錠。
4. 原先在晚上服用 Metformin XR 的患者，應先跳過最後一次劑量，再開始服用 XIGDUO XR。

## ☞ 注意事項

1. 建議在開始本品治療之前並在使用期間定期評估腎功能。
2. 有肝功能不全、酒精中毒或心衰竭病史的患者，或計畫接受動脈注射含碘顯影劑的患者，在進行血管內注射含碘顯影劑的放射性檢查時或檢查前都要先暫停 XIGDUO XR

治療，等到檢查後 48 小時重新評估 eGFR，確定腎功能穩定後，方可重新開始服藥。

3. XIGDUO XR 不建議用於肝功能不全患者。

4. XIGDUO XR 禁用於以下患者：

(1) 中度至重度腎功能不全(eGFR 小於 60 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>)，未

(2) 期腎病或洗腎的患者。

(3) 對 Dapagliflozin 曾發生嚴重過敏反應或對 Metformin hydrochloride 過敏。

(4) 急性或慢性代謝性酸中毒，包括糖尿病酮酸中毒，有或無伴隨昏迷。糖尿病酮酸中毒應該用胰島素治療。

5. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即諮詢醫師或藥師：低血壓、腎功能異常、泌尿道生殖系統黴菌感染、低血糖。

## 藥品儲存

儲存於 30°C 以下。