



藥物成分	劑型	櫃號
Insulin Glargine	針劑	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-633		

☞ 藥品商品名及含量

糖德仕注射劑 300 國際單位/毫升 1.5 毫升/支 (Toujeo)

☞ 藥品作用

本藥品為長效型胰島素，用來治療糖尿病。

☞ 使用方式

1. 通常每日一次固定時間進行皮下注射，施打劑量請依醫師指示，不可自行調整劑量或施打次數。必要時，病人可在平常注射時間提前或延後 3 小時內注射。

2. 操作步驟：

1 消毒




用酒精棉片消毒橡膠處

2 上針頭



撕開針頭封條

3 垂直裝上針頭並鎖緊



4 通暢測試



轉動劑量選擇扭到刻度3

5 拔去針頭內外蓋，針頭朝上，注射鈕按到底，排出注射液



6 注射



轉動劑量選擇鈕到需要注射的劑量位置(例如:15單位)

7 將注射鈕壓到底直到刻度歸零，並請停留5秒後再拔出針



8 回收針頭



套上針頭外蓋，反方向轉下針頭，丟入醫療回收罐

3. 以輪流方式轉換不同注射部位，注射完請勿按摩注射部位，施打部位選擇有：

			
<p>手臂上臂外側後方</p>	<p>大腿外上四分之一處</p>	<p>臀部髖關節以下第二手掌區</p>	<p>腹部肚臍周圍一個拳頭外的範圍</p>

4. 清潔方式：於每次使用前用酒精棉片消毒橡皮處。

⊗ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**曾經低血糖**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有服用其他藥物，特別是其他降血糖藥物、乙型阻斷劑、巴金森氏症藥物(如 selegiline 或 rasagiline)、抗憂鬱藥物 (如 moclobemide)或類固醇。
3. 未開封放置於冰箱冷藏室(2-8°C)，可保存直到藥品包裝上打印的保存期限為止；如已開封放置室溫 30°C 以下不需冷藏，需防日曬，可保存至開封後 42 天；如外出務必隨身攜帶，搭機時勿放置於行李箱中，也勿放置於車內。
4. 常見副作用為夜間低血糖、上呼吸道感染、鼻咽炎、注射部位疼痛、皮疹搔癢、脂肪代謝障礙、周邊水腫、體重增加，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**嚴重高血糖、嚴重低血糖(心跳加速、顫抖、冒冷汗、焦慮)、低血鉀(呼吸麻痺、心律不整)、全身性過敏(過敏性休克)**。
6. 低血糖可能傷害您集中注意力和反應的能力，記得索取**低血糖衛教單張**。
7. 懷孕及哺乳婦女接受胰島素治療對嬰兒沒有危險性，但建議於懷孕及哺乳期密集進行血糖控制，劑量也可能需要依據監測結果進行調整，有需要請事先諮詢醫師/藥師。