

藥物成分

劑型

櫃號

Quetiapine

口服液

版本：TPE202309 / 檔號：2023-369

## ☞ 藥品商品名及含量

康停懸液劑 25 毫克/毫升 (Qting Susp.)

## ☞ 藥品作用

用於思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作治療。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

## ☞ 服用方式

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
2. 使用前請震搖均勻。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胃腸疾病、乳癌、癲癇、尿滯留、肝功能不良、心律異常。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥、紅黴素、抗黴菌藥、情緒穩定劑、降血壓藥。
3. 常見副作用為嗜睡、頭暈、口乾、輕微無力、便秘、體重增加、姿態性低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、錐體外徑症狀(肌肉痙攣/無力、伸舌頭)、男性女乳症(溢乳)、心律異常、癲癇。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 服藥期間由坐或躺的姿勢要站起來時，請慢慢地移動，以避免姿勢變化太快，造成頭暈而跌倒。
7. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒

確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

8. 精神疾病本身就伴有自殺的風險增加。開始接受本藥治療的病人，不拘年齡，都應受到適當的監視，並且密切觀察有無臨床症狀惡化、自殺或不尋常的行為改變。
9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
10. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。