



藥物成分	劑型	櫃號
Metoclopramide	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-293		

☞ 藥品商品名及含量

胃明朗膜衣錠 5 毫克/錠 (Promeran)

杏止嘔明膜衣錠 3.84 毫克/錠 (Sinvomin)

☞ 藥品作用

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

☞ 服用方式

1. 通常成人每次 1~2 粒，一天 3 次，飯前服用。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、帕金森氏症、憂鬱症、肝腎臟疾病病史、心臟病、消化道出血、穿孔或腸道阻塞、疑似有嗜鉻細胞瘤(有引起血壓急劇上升之虞)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是麻醉性止痛劑、胰島素、精神科藥物、Prochlorperazine、Chlorpromazine、Haloperidol、Sulpiride、Carbamazepine 或 Digoxin 等。
3. 投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能造成血中濃度過高，且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用此藥品相關的不良反應，於小兒族群比起成人更容易發生。
4. 酒精：請勿飲用酒類，酒精會增強嗜睡的副作用。
5. 常見副作用為嗜睡、坐立不安、無力、便秘、腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：四肢或眼睛不隨意運動、頸部、顏面及下巴肌肉痙攣、情緒改變(抑鬱)。
7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。