

藥物成分

劑型

櫃號

**Sodium Flavin Adenine
Dinucleotide/
Chlorpheniramine Maleate/
Pyridoxine HCl/
Taurine/
Dipotassium Glycyrrhizinate**

眼
用
藥

版本：TPE202309／檔號：2023-185

☞ 藥品商品名及含量

眼晶眼藥水 0.5 毫克及 0.2 毫克及 1 毫克及 5 毫克及 0.5 毫克/毫升；10 毫升/瓶 (Engene eye drops)。

☞ 藥品作用

改善眼睛疲勞、眼睛癢，暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適。

☞ 使用方式

通常一天3~6次，每次1~2滴。劑量及間隔請依醫師指示，不可自行調整劑量或使用次數。

眼藥水使用步驟



1. 頭後仰或平躺，拉開下眼瞼



2. 眼睛朝上看，藥水瓶口朝眼瞼附近的眼白處點一滴眼藥水



3. 輕閉雙眼 2-5 分鐘並按壓眼內角鼻淚管處

 注意事項

1. 若要點2種以上眼藥水，每種間隔5~10分鐘；同時點眼藥水及眼藥膏時，應先點眼藥水，並最少10分鐘後再點眼藥膏。
2. 平時請放置在陰涼避光處(25°C以下)保存，眼藥開封後1個月未使用完畢即應丟棄。若顏色有變化、顆粒或混濁沉澱物，出現異味，則不可再使用。
3. 本藥含Benzalkonium Chloride防腐劑，可能造成眼部刺激，不建議配戴隱形眼鏡時使用。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是青光眼、正在接受醫師治療或使用其它醫師處方眼藥等。
5. 常見副作用為眼睛刺激(紅、腫、熱、痛)、視力模糊。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：眼部劇痛與全身性過敏反應，包括血管性水腫、蕁麻疹及搔癢、皮疹、呼吸急速、罕見支氣管痙攣。
7. 目前對胎兒的風險證據不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。