

藥物成分

劑型

櫃號

Alpelisib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-466

☞ 藥品商品名及含量

愛克利膜衣錠 150 毫克/ 錠 (Piqray)。

☞ 藥品作用

與fulvestrant併用可治療患有荷爾蒙受體陽性(HR+)、第二型人類表皮生長因子受體陰性(HER2-)及PIK3CA突變的局部晚期或轉移性乳癌，且曾接受內分泌治療但疾病惡化的停經後女性及男性病人。

☞ 服用方式

1. 愛克利膜衣錠建議劑量為每日一次隨餐口服 300 毫克 (兩粒 150 毫克的膜衣錠)。
2. 愛克利膜衣錠應整粒吞服，吞服前不可咀嚼、壓碎或剝開。錠劑若裂開、破碎或不完整，請勿服用。

☞ 注意事項

1. 病人應於每日固定時間服用，如錯過平日服藥時間，可於平時服藥時間後的 9 小時內隨餐服用。如超過 9 小時，請跳過當日劑量，隔天在平時的服藥時間服用。
2. 如在服藥後嘔吐，建議當天不應再服用額外劑量，隔天再於平時的服藥時間服用。
3. 愛克利膜衣錠禁用於對藥物本身或其中任何成分**嚴重過敏**(如呼吸困難、潮紅、皮疹、發燒等)的病人。
4. 如發生嚴重皮膚不良反應(如史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等))，應停止服藥並回診。
5. 可能的藥物副作用：高血糖、皮疹、腹瀉。

☞ 其他注意事項

1. 有生育能力的女性在開始接受愛克利膜衣錠治療之前，需確認是否懷孕。
2. 愛克利膜衣錠用於懷孕女性可能對胎兒造成傷害，故有

生育能力的女性，在治療期間直到接受最後一劑藥物治療後 1 週內，應使用有效的避孕方法避孕。

3. 有女性伴侶且女性伴侶有生育能力的男性病人，在治療期間直到接受最後一劑藥物治療後 1 週內，應使用保險套及有效的避孕方法避孕。
4. 哺乳婦女於治療期間直到接受最後一劑藥物後 1 週內，不可哺乳。