



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Trihexyphenidyl</b>	<b>口服液</b>	

版本：TPE202309／檔號：2023-050

## ☞ 藥品商品名及含量

亞典內用液 0.4 毫克/毫升，100 毫升/瓶 (Ea Ten)。

## ☞ 藥品作用

改善帕金森氏症候群相關症狀，如運動困難、靜坐不能、肌肉僵硬、震顫、流口水、意欲低下、抑鬱等症狀。

## ☞ 服用方式

1. 通常一天服用 3~4 次，醫師會依據您的症狀調整劑量。
2. 飯前或飯後服用看身體狀況決定，如果有流口水建議飯後使用；如會口乾建議飯前服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是青光眼、重症肌無力。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是精神安定劑 phenthiazine 類藥物。
3. 本藥可能會讓人暈眩、視力模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 請按醫囑完成療程頻率及天數，不可突然停藥。
5. 常見副作用為噁心、口乾、暈眩、視野模糊，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：無故神經質或緊張。
7. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。