



藥物成分	劑型	櫃號
Budesonide	鼻噴劑	
版本：TPE202309／櫃號：2023-541		

☞ 藥品商品名及含量

適鼻能鼻腔定量噴液劑 64 微公克/劑量

(BUNO Nasal Aqua.)

碧適清鼻腔定量噴液劑 64 微公克 (Besonin Aqua Nasal Spray)



指導短片(碧適清)

☞ 藥品作用

治療過敏所引起的鼻塞及流鼻水症狀。


☞ 使用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次每個鼻孔 1~2 劑。
2. 若對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。並請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記使用，立即補上一個劑量；但若接近下一次使用的時間，在下次用藥時間使用藥物即可。不要為了補錯過的劑量而使用雙倍劑量。
3. 首次使用適鼻能鼻噴劑前請詳讀隨附的說明書，可要求您的醫師、藥師或呼吸治療師示範正確的鼻噴劑使用技巧，並在他們面前練習。


請依下面步驟使用鼻噴劑：

- (1). 將鼻子擤乾淨。
- (2). 打開瓶蓋。
- (3). **第一次用藥前**，充分搖勻後，對空噴壓藥劑數次，以確保噴出藥霧量均勻 (圖一)。
- (4). 確定可暢通使用後，使用前不須再退對空噴藥，只需搖勻即可使用。
- (5). 捏住一鼻孔，並將噴頭放入另一鼻孔 (圖二)，屏住呼吸將藥品壓出至鼻內。

圖一



圖二



(6).換另一鼻孔給藥。

(7).假如醫師處方二個劑量，請重複步驟。(5)(6)。

(8).以乾的面紙擦乾淨噴頭，再蓋回瓶蓋。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是結核病、疱疹、鼻腔有黴菌感染者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌、過敏及氣喘藥藥物。
3. 常見副作用為鼻子刺激或發熱、鼻出血或鼻痛、頭昏眼花、胃不舒服、咳嗽、聲音沙啞、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難，喉嚨、嘴巴、鼻子有白斑、經期不規則、嚴重的痤瘡、臉部水腫。
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

清潔方式

定期清潔上面之塑膠部分。移除半透明色保護蓋並向上拔出白色鼻用噴嘴；以溫水清洗塑膠部分。先在空氣中完全乾燥後再蓋回去。