



藥物成分	劑型	櫃號
Desflurane	吸入液	
版本：TPE202309／檔號：2023-142		

☞ 藥品商品名及含量

輸活能液態吸入劑 240 毫升 (Suprane(Desflurane))

每毫升包含主成分 desflurane 1ml，為無色、不可燃的，揮發性液體(在 22.8°C 之下)。

☞ 藥品作用

1. **麻醉誘導**：適用於成人在住院及門診手術誘導期之吸入性麻醉劑。
2. **麻醉維持**：適用於成人與兒科病人住院或門診手術之吸入性麻醉維持。

☞ 服用方式

Suprane 應由受過良好全身麻醉訓練之醫師使用，使用時應配合特殊設計之揮發器。維持病人呼吸道暢通之器具、人工呼吸器、充足氧氣供應與急救復甦器具必須準備充分。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是：
 - (1) 已知或懷疑會產生惡性高熱症。
 - (2) 杜氏肌營養不良症(Duchenne muscular dystrophy)或其他潛伏神經肌肉疾病之病史。
 - (3) 肝硬化、病毒性肝炎等肝臟疾病。
 - (4) 曾在鹵素類麻醉劑或 Suprane 麻醉後中度至重度肝功能障礙，無其他解釋原因。
 - (5) 對 Suprane 或鹵素類麻醉劑過敏。
 - (6) 禁止施行全身麻醉的病人。
 - (7) 兒科麻醉誘導的病人。
 - (8) 前次麻醉任何嚴重之不良反應。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是聖約翰草、BZD 類安眠藥、鴉片類藥物、神經肌肉阻斷

劑、N₂O。

3. **氣道狹窄監測**：患有氣喘或近期有上呼吸道感染史的兒童維持麻醉期間，氣道狹窄和氣道阻力增加的風險增加。
4. **喉痙攣監測**：經由喉罩(LMA™面罩)給予 Suprane 麻醉維持的兒童，尤其是6歲或年齡更小，會增加呼吸不良反應，如：咳嗽、喉痙攣，特別是深度麻醉下移除喉罩。
5. **心律監測**：對敏感病人(如先天性長QT症候群病人或服用可延長QT間期藥物的病人)投與 Suprane 時，小心監測心律。
6. 現今無資料顯示 Suprane 是否對病患術後交通工具駕駛或器械操作能力有影響。但是接受麻醉藥劑後，這些技能有可能受到影響。
7. 兒童麻醉恢復期間可能引起短暫對指令無法配合的狀況。
8. 常見副作用為**咳嗽、呼吸停止、噁心、窒息、嘔吐、分泌增加、氣管收縮、咽喉炎等**，大部份不良反應是輕微且短暫的，且可能和手術、病人情況(包括疾病)或其他給藥相關。
9. 如果有下列症狀請立刻就醫：**過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、惡性高熱症(血碳酸過高，肌肉僵直，心跳過快，呼吸急促、發紺、心率不整、血壓不穩等)、術中高血鉀(血清肌酸酐活化酶濃度明顯提高)、QT間期延長。**
10. 懷孕等級B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
11. Suprane 可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

☞ 藥品儲存

應儲存在室溫 15-30°C 之下，Suprane 在效期前皆會維持穩定。每次使用後應確定瓶蓋有蓋上。