



藥物成分

劑型

編號

**Linagliptin/
Metformin**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-654

☞ 藥品商品名及含量

糖倍平膜衣錠 2.5 毫克/ 850 毫克/錠 (Trajenta Duo)

☞ 藥品作用

本藥需與飲食控制及運動配合治療，藉以改善第 2 型糖尿病成人病人的血糖控制效果。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日一次口服 1 到 2 錠，於用餐時服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，本藥禁用於腎功能 (eGFR) 低於 30 mL/min/1.73 m²、急性或慢性代謝性酸中毒，包括糖尿病酮酸中毒。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 dolutegravir、vandetanib。
3. 靜脈注射顯影劑有導致急性腎功能下降的風險，因此醫師為病患注射顯影劑應先停用 metformin，且需確認病患之後腎功能恢復正常，才能開始使用 metformin。
4. 常見副作用腹瀉、鼻咽炎、低血糖、食慾下降、噁心、嘔吐、發癢等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 服藥期間若發生低血糖症狀(心悸，冒冷汗，飢餓，頭痛頭暈)，先食用含糖飲料或糖果，仍未見改善時應即就醫。
6. 在懷孕婦女中，使用糖倍平資料十分有限，預備懷孕、

臺北市立

聯合醫院

已懷孕應立即諮詢醫師。

7. 本藥會分佈至母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。