

藥物成分

劑型

櫃號

Cabazitaxel

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-823

☞ 藥品商品名及含量

去癌達注射劑 60 毫克/1.5 毫升 (Jevtana)

☞ 藥品作用

經由抑制微小管分解，抑制細胞進行有絲分裂及細胞分裂期間的細胞功能，來達到減少癌細胞的效果。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是白血球低下、嚴重肝功能不全。
2. 常見副作用為腹瀉、味覺改變、食慾降低、肌肉關節疼痛、血尿等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重噁心嘔吐、異常出血(血尿、黑便)、瘀傷、呼吸困難、皮膚蒼白、貧血、發燒。
4. 懷孕等級D，資料顯示動物實驗中有胚胎死亡的紀錄，接受治療期間應採取有效避孕措施，計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥、抗病毒藥、抗癲癇或結核病藥物，聖約翰草St. John's Wort、Statin類降膽固醇藥。