

藥物成分

劑型

櫃號

**Pemetrexed  
Disodium**

**針劑**

版本：TPE202406／檔號：2023-862

## ∞ 藥品商品名及含量

派癌休注射液 100 毫克/4 毫升 (Pexeda)

愛寧達注射劑 100 毫克 (Alimta)

愛寧達注射劑 500 毫克 (Alimta)

## ∞ 藥品作用

此藥品為葉酸拮抗劑抗癌藥物，藉由阻斷細胞複製必須之葉酸依賴性代謝過程，以達到抗腫瘤的作用。可單一使用或併用含鉑化合物Cisplatin作為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌、惡性肋膜間質細胞瘤之治療。

## ∞ 注意事項

1. 進行治療前，宜補充口服葉酸與肌肉注射之維生素B12，以降低治療相關的血液毒性。
2. 常見副作用為伴隨發燒之嗜中性白血球減少症、感染、脫水、肝指數上升、肌酸酐清除率下降、皮膚搔癢與便秘等。如有任何不適，請立刻就醫。
3. 此藥品的懷孕分級為D，孕婦接受此藥品的治療會對胎兒造成傷害，女性於治療期間宜採用有效的避孕方式避免懷孕。女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師。
4. 此藥品對於授乳的資料尚不充足，應考量藥物治療對於授乳母親的重要性，進而決定停止授乳或停止藥物治療。
5. 此藥品對於孩童病患的療效尚未獲得證實。
6. 如果您有藥物過敏、腎功能不良或是其他疾病，請於治療前告知醫師及藥師。