

藥物成分

劑型

櫃號

Vincristine

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-879

☞ 藥品商品名及含量

文克斯汀注射液 1 毫克/1 毫升 (Vincristine)

☞ 藥品作用

用於急性白血病。與其他抗腫瘤藥品併用，可用於Hodgkin's、非Hodgkin's惡性淋巴瘤、橫紋肌肉瘤、神經母細胞瘤、Wilm's腫瘤、骨癌、蕈樣肉芽腫、Ewing's瘤、子宮頸瘤、乳癌、惡性黑色瘤、肺的oat-cell瘤。

☞ 注意事項

1. 若有下列情形，需要評估是否適用此藥物，請告知您的醫師：曾對此藥或vinca alkaloids過敏者、正接受透過肝門接受放射線治療的病人。
2. 常見的副作用有：掉髮、便秘、腹部痙攣、噁心、嘔吐、高尿酸血症、排尿障礙、神經肌肉症狀如感覺異常、感覺遲鈍周邊神經炎、神經痛等。
3. Vincristine只用於靜脈內注射，不可由其他途徑給予。
4. 此藥預期會對胎兒造成傷害，懷孕期間避免使用本藥，具生育能力的女性於治療期間應使用有效的避孕方式。
5. 本藥尚不清楚是否會分泌到乳汁中，因可能對嬰兒引起嚴重不良反應，在治療期間不可哺乳。
6. 重要的藥品交互作用：
 - (1) 活性減毒疫苗：如輪狀病毒疫苗、水痘疫苗、卡介苗疫苗、MMR疫苗、小兒麻痺疫苗、黃熱病疫苗。避免同時使用。
 - (2) 強效CYP3A抑制劑：如ketoconazole、voriconazole、clarithromycin、ritonavir等，同時使用會增加Vincristine曝藥量。有併用情況需特別注意。
 - (3) 強效CYP3A誘導劑：如rifampin、phenobarbital等，同時使用會減少Vincristine曝藥量。有併用情況需特別注



臺北市立聯合醫院

(4) Warfarin：可能增加出血風險，有併用情況需特別注意。