

藥物成分

劑型

櫃號

Entrectinib

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-837

☞ 藥品商品名及含量

羅思克膜衣錠 200 毫克(Rozlytrek)

☞ 藥品作用

治療ROS1陽性之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)或NTRK基因融合陽性之實體腫瘤的患者。

☞ 服用方式

1. 建議劑量成人每日1次，每次3顆，可空腹或與食物併服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是充血性心臟衰竭。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥ketoconazole、抗生素rifampicin、抗心律不整藥等。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為水腫、疲倦、噁心、感覺遲鈍、頭痛、視力異常、睡眠障礙等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心律異常、貧血、頭暈、認知異常、呼吸困難、咳嗽及發燒等疑似肺炎症狀。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間及最後一劑藥物後1週內暫停哺餵母乳。