

藥物成分

劑型

櫃號

Lorlatinib

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-851

## ☞ 藥品商品名及含量

瘤利剋膜衣錠 25 毫克(Lorviqua)

## ☞ 藥品作用

適用於ALK陽性之晚期非小細胞肺癌(NSCLC)成人病人。

## ☞ 服用方式

1. 每日一次，每次4粒。應整粒吞服，請勿咀嚼、磨碎或剝半，可伴隨或不伴隨食物服用，直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性。
2. 若遺漏劑量時應補服，除非下個劑量的服藥時間在4小時以內。請勿為了補足漏服的劑量而同時服用2個劑量。若服用後發生嘔吐，請勿服用額外劑量，但應繼續服用下個排定劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中、重度肝腎功能疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強效CYP3A4誘導劑/抑制劑、fluconazole。
3. 可能出現血清膽固醇和三酸甘油酯升高的情況；若您有糖尿病，建議治療期間也應密切監測血糖值。
4. 常見副作用為水腫、周邊神經病變、高膽固醇血症、認知影響、疲倦、體重增加、關節痛、情緒影響和腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心悸、呼吸困難、發熱、精神狀態改變、胸痛及昏厥。
6. 婦女應避免懷孕且全孕期避免使用；服藥期間與停藥後1週內不建議哺乳。