

藥物成分

劑型

櫃號

Docetaxel

針劑

版本：TPE202406 / 檔號：2023-834

☞ 藥品商品名及含量

剋癌易 20 毫克/毫升 (Taxotere)

鈦能注射劑 20 毫克/毫升 (Tynen)

☞ 藥品作用

本藥在癌細胞進行複製時會促進微管次體聚合成穩定的微小管，並抑制微小管的分離，干擾細胞進行有絲分裂來達到抗腫瘤的效果。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是酒精。
2. 治療期間，請勿飲用酒類，本藥會增強酒精的作用。
3. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為寒顫、發熱、注射部位紅斑或疼痛、體重增加等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發燒、心跳快速或不規則、呼吸困難、頻尿。
6. 資料顯示動物實驗中有胚胎死亡的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳直到療程結束後一週。
8. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥ketoconazole、terfenadine、抗生素erythromycin、抗排斥藥cyclosporin。