

藥物成分

劑型

櫃號

Brigatinib

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-822

☞ 藥品商品名及含量

癌能畢膜衣錠 30 毫克 (Alunbrig)

癌能畢膜衣錠 90 毫克 (Alunbrig)

☞ 藥品作用

治療ALK陽性的晚期非小細胞肺癌(NSCLC)患者。

☞ 服用方式

1. 成人每日 1 次，每次劑量依照醫師指示服用，可空腹或與食物併服。
2. 應整粒吞服藥錠，請勿磨碎或咀嚼藥錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，或於服用後發生嘔吐反應，請不要補服，直接依照平常時間服用下一劑，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是半乳糖不耐症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥ketoconazole、抗生素rifampicin、質子幫浦抑制劑、排出轉運體P-glycoprotein抑制劑等。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為高血壓、疲倦、腹瀉、心搏徐緩、肌痛、貧血等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 服藥期間請注意防曬措施，如果有下列症狀，請立刻就醫：**呼吸困難、咳嗽及發燒等疑似肺炎症狀。**
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間及最後一劑藥物後1週內暫停哺餵母乳。