

藥物成分

劑型

櫃號

Neratinib
Maleate

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-856

☞ 藥品商品名及含量 賀儷安膜衣錠 40 毫克(Nerlynx)

☞ 藥品作用

適用於患有人類表皮生長因子受體2 (HER2)陽性之早期乳癌成人病人，作為在含trastuzumab輔助性療法之後的單一強化輔助性治療。亦可與capecitabine併用於曾經接受兩種以上抗HER2療程治療轉移性之晚期或轉移性乳癌。

☞ 服用方式

1. 建議劑量成人每日 1 次，每次 6 顆，隨餐與食物併服。
2. 應整粒吞服藥錠，請勿磨碎或咀嚼藥錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，在下次用藥時間正常服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥ketoconazole、抗生素rifampicin、質子泵抑制劑、排出轉運體P-glycoprotein等。
3. 改變胃腸道酸鹼值的藥物可能會影響Nerlynx吸收和全身曝藥量。應避免與質子泵抑制劑(PPI)併用。當病人需要降胃酸藥物時，使用H2受體拮抗劑或制酸劑，並且制酸劑與Nerlynx給藥須間隔至少3小時，而在服用H2受體拮抗劑至少2小時前或10小時後，再服用Nerlynx。
4. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
5. 常見副作用為腹瀉、疲倦、噁心、食慾減退或皮膚乾燥等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 建議病人以NERLYNX的第一劑開始進行止瀉預防治療，建議維持每天1至2次排便。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：腹痛、重度腹瀉或您的腹瀉伴隨虛弱、頭暈或發燒。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間及最後一劑藥物後1個月內暫停哺餵母乳。