

藥物成分

劑型

櫃號

Epirubicin

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-838

☞ 藥品商品名及含量

益彼欣注射劑 20 毫克/10 毫升 (Epicin)

☞ 藥品作用

Epirubicin的作用機轉尚未完全明瞭，可能與其結合DNA的能力有關。

細胞培養的實驗證實，會穿透細胞進入細胞核，抑制核酸合成及有絲分裂。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾接受抗癌藥物治療及放射線治療而引起骨髓抑制、現有或曾有心臟功能不全病史。
2. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、黏膜炎、掉髮、白血球減少、血小板減少、輕微貧血、心跳加速等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心臟毒性症狀(心律不整、心臟衰竭)。
4. 懷孕等級D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是mitozantrone、mitomycin C或anthracycline類化合物，如doxorubicin、daunorubicin，且達最高累積劑量。