

藥物成分

劑型

櫃號

**Sacituzumab
govitecan**

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-867

☞ 藥品商品名及含量

拓達維注射劑 180 毫克/瓶 (Trodelvy)

☞ 藥品作用

本藥是一種Trop-2為導向的抗體藥物複合體(ADC, antibody-drug conjugate)。藉由與拓樸異構酶I (topoisomerase I)相互結合作用，造成腫瘤細胞死亡，以達到抗腫瘤的作用。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物、中草藥、非處方藥或營養補充品。
3. 常見副作用為疲勞、噁心、嘔吐、掉髮、食慾缺乏、嗜中性白血球減少症及便秘等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. **如果有下列症狀，請立刻就醫：貧血、感染症狀如發燒、持續性的噁心嘔吐、嚴重腹瀉或脫水。**
5. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，接受治療期間應採取有效避孕措施直至療程結束後6個月。此藥目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗有致畸胎的紀錄。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師，建議在治療期間及最後一次給藥後1個月內不要哺乳。