



| 藥物成分   | 劑型         | 櫃號 |
|--|------------|----|
| <b>Tepotinib<br/>Hydrochloride<br/>Hydrate</b> | <b>口服藥</b> |    |
| 版本：TPE202406／檔號：2023-868                       |            |    |

## ☞ 藥品商品名及含量

德邁特膜衣錠 225 毫克/錠 (Tepmetko)

## ☞ 藥品作用

適用於治療帶有導致間質上皮轉化因子外顯子-14跳讀式突變(MET exon 14 skipping mutation)的轉移性之非小細胞肺癌(NSCLC)成人病人。

## ☞ 服用方式

1. 成人建議劑量每日 1 次，每次 2 粒。
2. 應整粒吞服藥錠，請勿剝開、磨碎或咀嚼藥錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥或服藥後嘔吐，應在下次用藥時間正常服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥ketoconazole、抗結核藥rifampicin、質子泵抑制劑、排出轉運體P-glycoprotein等。
3. 常見副作用為水腫、倦怠、噁心、腹瀉、咳嗽等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. **如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、發燒、肺炎。**
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間及最後一劑藥物後1週內暫停哺餵母乳。