

藥物成分	劑型	櫃號
Leuprorelin acetate	針劑	
版本：TPE202406／檔號：2023-850		

☞ 藥品商品名及含量

癌立佳持續性藥效皮下注射劑 22.5 毫克 (Eligard)

癌立佳持續性藥效皮下注射劑 7.5 毫克 (Eligard)

柳菩林一個月持續性藥效皮下注射劑 3.75 毫克 (Leuplin Depot 1M)

☞ 藥品作用

1. 本藥具有強力的腦下垂體—性腺機能抑制作用。
2. 柳菩林一個月持續性藥效皮下注射劑：用於治療子宮內膜異位、中樞性早熟症、子宮肌瘤、停經前乳癌病人及前列腺癌舒解治療。
3. 癌立佳持續性藥效皮下注射劑：用於晚期前列腺癌舒解治療，以及與放射治療併用於高風險的局部和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌治療。

☞ 使用方式

本藥應在醫療人員的監督下注射並監測治療的反應。


柳菩林 3.75毫克，每4週皮下注射一次。

癌立佳 7.5毫克，1個月皮下注射一次。

癌立佳 22.5毫克，每3個月皮下注射一次。

☞ 注意事項

1. 柳菩林一個月持續性藥效皮下注射劑：禁用於已懷孕或可能懷孕的婦人及哺乳中的婦人。
癌立佳持續性藥效皮下注射劑：禁用於婦女和兒童。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心律不整、心血管疾病。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥物amiodarone、sotalol、dofetilide、ibutilide，methadone、moxifloxacin、抗精神病藥品等。
4. 常見副作用為：熱潮紅、失眠、發汗、關節痛、皮疹、



搔癢、周邊水腫、感覺異常、體重增加、貧血等，以及其他不良反應如骨密度降低、血糖異常，心血管疾病的風險可能增高，若症狀惡化且無法忍受，或是皮膚紅腫疼痛或起水泡、任何部位產生紅腫熱痛的感染症狀請回診。