

藥物成分

劑型

櫃號

Doxorubicin**針劑**

版本：TPE202406／檔號：2023-835

☞ 藥品商品名及含量

利癌凍晶注射劑 10 毫克 (Doxor Lyo)

力得微脂體注射劑 20 毫克/10 毫升 (Lipo-Dox)

德露斯微脂體注射劑 20 毫克/10 毫升(Doxlox)

☞ 藥品作用

可與DNA結合抑制核酸合成及抑制細胞有絲分裂，亦具有免疫抑制作用。是一種不受限於細胞分裂周期特異性的細胞毒性藥物。可單用或與其他化療藥並用治療多種癌症。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**心肌梗塞、心肌功能不全、嚴重口腔炎**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥phenobarbital、phenytoin、抗排斥藥cyclosporin、propranolol。
3. 用藥後1或2天內尿液可能呈現紅色
4. 常見副作用為**噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦、掉髮、鼻出血、結膜炎**等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**不明發燒或疑似感染症狀、口腔喉嚨潰瘍、掌蹠紅斑觸痛症候群(手掌或腳底灼熱、刺痛、脫皮或水泡)、心跳異常或心臟衰竭症狀(常見表現為呼吸困難、下肢水腫、白日寡尿/夜尿多、心搏過速)**。
6. 懷孕等級D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。