

藥物成分

劑型

櫃號

Trastuzumab

注射劑

版本：TPE202406／檔號：2023-872

## ☞ 藥品商品名及含量

賀癌平皮下注射劑 600 毫克 (Herceptin SC)

## ☞ 藥品作用

Herceptin 為單株抗體，使用於 HER2 過度表現或 HER2 基因 amplification 之早期乳癌、轉移性乳癌病人。

## ☞ 服用方式

1. 不論病人體重多寡，Herceptin SC 之建議固定劑量為 600 mg，每 3 週給藥一次。
2. 注射部位應在左右大腿之間輪替。新的注射部位與舊的注射部位應相距至少 2.5 公分，且不得在皮膚發紅、瘀青、觸痛或硬塊處注射。
3. 若 Herceptin SC 治療期間欲皮下注射其他藥物，則最好施打於不同部位。
4. 若病人錯過一劑 Herceptin SC，建議儘快注射下一劑 600 mg 藥物。

## ☞ 注意事項

1. 禁止使用於已知會對 trastuzumab 或產品中任何成分有過敏反應的病人。
2. 常見副作用:全身無力、疼痛、發燒、噁心、嘔吐。
3. 少見但嚴重之副作用:心肌病變、肺毒性。
4. 請勿飲酒，飲酒會加強藥物副作用的產生。