

藥物成分

劑型

櫃號

Alectinib

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-811

☞ 藥品商品名及含量

安立適膠囊 150 毫克 (Alecensa)

☞ 藥品作用

治療ALK陽性的晚期非小細胞肺癌(NSCLC)患者。

☞ 服用方式

1. 建議成人每日 2 次，每次 4 粒，與食物併服。
2. 應持續依照醫師指示服用，直到出現疾病惡化的現象或無法耐受的毒性反應為止。切勿打開膠囊或將膠囊內容物溶化使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，或於服用後發生嘔吐反應，請不要補服，直接依照平常時間服用下一劑，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥或抗高血壓藥。
3. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如：紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
4. 常見副作用為水腫、疲倦、便秘、心搏徐緩、肌肉痠痛等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳過慢或異常、不明原因的肌肉疼痛或觸痛、呼吸困難、咳嗽及發燒等疑似肺炎症狀。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間及最後一劑藥物後一週內暫停哺餵母乳。