

藥物成分

劑型

櫃號

Rituximab

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-866

☞ 藥品商品名及含量

莫須瘤皮下注射劑 1400 毫克/11.7 毫升 (Mabthera)

莫須瘤注射劑 500 毫克/50 毫升 (Mabthera)

莫須瘤注射劑 100 毫克/10 毫升 (Mabthera)

洛希隆注射劑 500 毫克/50 毫升 (Rixathon)

洛希隆注射劑 100 毫克/10 毫升 (Rixathon)

☞ 藥品作用

本藥是一種人類免疫球蛋白單株抗體，與在B淋巴細胞上的CD20抗原結合，且啟動免疫反應，藉以調控細胞的溶解來減緩、阻止細胞生長。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是其他疾病，例如：合併感染B型肝炎或是帶原者或是心臟衰竭的患者。
2. 常見副作用為：皮疹、搔癢、噁心嘔吐等，以及其他不良反應如嗜中性白血球減少、白血球減少、輸注部位疼痛、或低血壓，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 治療期間接種疫苗可能效果不佳。一般不建議接種活性減毒疫苗。
4. 懷孕等級C，資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，接受治療期間應採取有效避孕措施直至療程結束後12個月，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間及治療後6個月內，暫停哺餵母乳。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，或是中草藥、非處方藥或營養補充品。
7. 目前無特殊臨床藥物交互作用。