

藥物成分

劑型

櫃號

Capmatinib

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-824

## ☞ 藥品商品名及含量

泰芮塔膜衣錠 200 毫克(Tabrecta)

## ☞ 藥品作用

治療其腫瘤帶有導致間質上皮轉化因子外顯子14突變的轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者。

## ☞ 服用方式

1. 建議劑量成人每日2次，每次2顆，可空腹或與食物併服。
2. 應整粒吞服藥錠，請勿磨碎或咀嚼藥錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥ketoconazole、抗生素rifampicin、降膽固醇藥Rosuvastatin、排出轉運體P-glycoprotein、降胃酸藥物等。
3. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如：紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
4. 常見副作用為水腫、疲倦、噁心、食慾減退等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：黃疸、呼吸困難、咳嗽及發燒等疑似肺炎症狀。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間及最後一劑藥物後1週內暫停哺餵母乳。