

藥物成分

劑型

櫃號

Irinotecan

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-848

藥品商品名及含量

抗癌妥 靜脈輸注濃縮液 100 毫克/5 毫升 (Campto)

癌可癒 靜脈輸注濃縮液 20 毫克/毫升 (Innocan)

藥品作用

抑制細胞生長的第一型拓樸異構酶(topoisomerase I) 抑制劑，藉此阻斷癌細胞的生長。本藥是晚期性大腸直腸癌之第一線治療藥物，可單獨使用，亦可與5-FU、Folinic acid 合併使用。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是慢性發炎腸道疾病、腸阻塞、慢性肝腎疾病、先天性果糖不耐症或是正在服用中草藥。
2. 治療期間，請維持足量水分攝取。
3. 常見副作用為：延遲性腹瀉(偶有偽膜性結腸炎)、嗜中性白血球減少症，血小板減少症、輸注後短時間出現腹瀉、發汗、瞳孔縮小、唾液增加、嘔吐噁心、脫水、掉髮、便秘或疲倦等，以及其他不良反應如厭食、皮膚反應，腹痛和黏膜炎，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 不能排除Irinotecan與神經肌肉阻斷劑之間產生交互作用的可能性。
5. 懷孕等級D，資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
7. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥物ketoconazole、結核病藥物rifampicin、抗癲癇藥 carbamazepine、phenobarbital、phenytoin、肌肉鬆弛藥 suxamethonium或是聖約翰草Hypericum perforatum製劑。