

藥物成分

劑型

櫃號

Bleomycin

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-819

## ☞ 藥品商品名及含量 撲類惡注射劑 15 毫克 (Bleocin)

## ☞ 藥品作用

頭、頸部癌(上頸癌、舌、口唇、咽喉等癌)、皮膚癌(包括陰莖、陰囊及婦女外陰癌等)、肺癌(原發性及轉移性扁平上皮癌)、食道癌、惡性淋巴腫(細菌肉腫、淋巴肉腫、何杰金氏病)。

## ☞ 注意事項

1. 若有下列情形，需要評估是否適用此藥物，請告知您的醫師：嚴重肺功能損傷或急性肺感染、曾對本藥過敏、嚴重腎功能異常、嚴重肝功能異常者。
2. 有以下情況者：生涯總計量大於 400 毫克(units)、年長、吸菸、肺部接受過放射治療者、可能會增加間質性肺炎及肺纖維化風險，若有肺部異常徵兆，請告知您的醫師。
3. 其他常見的副作用有：皮膚增生角化、紅疹、色素沉澱、腸胃不適、低血壓等。
4. 根據其作用機制和動物模型試驗的發現，此藥可能會導致胎兒傷害，懷孕期間不可使用本藥。
5. 對餵哺母乳之嬰兒的影響方面，目前並無任何資料，因可能對嬰兒產生嚴重不良反應，治療期間不要餵哺母乳。
6. 重要的藥品交互作用：Brentuximab與Bleomycin同時使用會增加肺部毒性，故不建議同時使用。